

WALMARK®

Emoxen GÉL

Písomná informácia pre používateľov

Informácie na použitie, čítajte pozorne!

Emoxen Gél

naproxenum
dermálny gél

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EMO-FARM, Sp. z o.o., Ksawerów, Poľsko

Výrobca

Vyrába WALMARK, a.s. v spolupráci s EMO-FARM, Sp. z o.o.

Zloženie lieku

Liečivo: naproxenum (naproxén) 100 mg v 1 g gélu

Pomocné látky: chlorali hydras (chloralhydrát), levomentolum (levomentol), ethanolum 96% (etanol 96%), ethylparabenum (etylparabén), carbomerum (karbomér), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua purificata (čistená voda)

Farmakoterapeutická skupina

Antiflogistikum, antireumatikum

Charakteristika

Liek obsahuje liečivo naproxén, ktorý pôsobí protizápalovo. Je vhodný na liečbu bolestivých reumatických i nereumatických stavov pohybového ústrojenstva.

Indikácie

Liek je určený na miestnu liečbu reumatických ochorení, zápalov kĺbových puzdier, zápalov šliach a svalových úponov, na liečbu bolestivých stavov pri degeneratívnych ochoreniach (spôsobených opotrebovaním), na liečbu porúrazových stavov ako sú pomliaždeniny, vyvrtnutia kĺbov a poranenia mäkkých častí kĺbov. Používa sa i v rehabilitačnej liečbe.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti od 12 rokov.

Kontraindikácie

Liek sa nesmie používať u pacientov so známou precitlivosťou na naproxén, alebo iné nesteroidové protizápalové liečivá, na salicyláty alebo na niektorú inú zložku lieku. Nesmú ho používať pacienti, u ktorých sa po použití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových liečiv objavila alergická reakcia (kožná vyrážka, ťažkosti s dýchaním).

Liek sa nesmie nanášať na sliznice a do očí. Ak by sa tak stalo, umyte postihnuté miesto a oči vypláchnite veľkým množstvom vody.

Liek nesmú používať ženy v tretej tretine tehotenstva a dojčiaci matky. Ženy v prvej a druhej tretine tehotenstva môžu liek aplikovať v závažných prípadoch.

Nemali by Emoxen Gél aplikovať na rozsiahle plochy kože alebo počas dlhšej doby.

Pacienti s ochorením obličiek, pečene, srdca a vredovou chorobou žalúdka a dvanástnika môžu liek používať iba na odporúčanie lekára.

Nežiaduce účinky

Výskyt nežiaducich účinkov je veľmi malý a reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť sú úplne výnimočne závažnejšieho charakteru. U citlivých pacientov môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu kože prejavujúcemu sa každou vyrážkou, začervenaním, podráždením a svrbením, ojedinele sa môže objaviť precitlivosť na svetlo.

Počas dlhodobého používania lieku nanášaného na veľké plochy kože môžu byť pozorované celkové nežiaduce účinky ako bolesti brucha, bolesti hlavy, ospalivosť, hnačka a nutkanie na vracanie.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakciách sa o ďalšej liečbe liekom poraďte so svojim lekárom.

V prípade reakcie z precitlivosťou (alergickej reakcie) prejavujúcej sa opuchmi v tvári a dýchavičnosťou, treba liečbu ihneď ukončiť a čo najskôr vyhľadať lekára.

Interakcie

Vzájomné ovplyvnenie iných súčasne užívaných liekov nie je pri kožnej aplikácii pravdepodobné. Napriek tomu bez rady lekára nenanášajte na rovnaké miesta iné lieky. O vhodnosti súčasného používania lieku Emoxen Gél s inými liekmi sa poraďte s lekárom.

Dávkovanie a spôsob podávania

Liek Emoxen Gél je určený výhradne na kožné podanie. Pri porúrazových stavoch, zápalových ochoreniach, bolestiach svalov a kĺbov sa aplikuje 2-6 krát denne počas 7 až 14 dní. Pokiaľ sa vyššie uvedené ťažkosti nezlepšia do 7 dní, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom. Bez rady lekára nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní. Pri reumatických ochoreniach sa liek používa iba na odporúčanie lekára. Na bolestivé miesto sa aplikuje primerané množstvo gélu (na plochu 10x10 cm sa použije približne 4 cm dlhý prúžok gélu) 3-4 krát denne. Dĺžku liečby v týchto prípadoch určuje lekár, obvyčajne postačuje liečba 2-4 týždne.

Gél sa jemne vtiera do kože, aby sa lepšie vstrebala.

Miesta aplikácie lieku sa nesmú pokrývať nepriedušnou náplastou či obväzom.

Liek sa nesmie aplikovať na rozsiahle plochy.

Po ošetrení si umyte ruky, ak sa liek nenanášal priamo na ne.

Upozornenie

Pretože počas používania tohto lieku sa môže objaviť precitlivosť na svetlo, nesmiete počas liečby a 2 týždne po liečbe vystavovať liečené miesta priamemu slnečnému žiareniu ani ultrafialovému žiareniu v soláriách.

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá ani obsluhu strojov.

Predávkovanie zvonku používaným liekom je veľmi nepravdepodobné. Pri náhodnom požití lieku vyhľadajte lekára.

Uchovávanie

Chráňte pred chladom a mrazom. Uchovávať v dobre uzavretom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Liek sa musí uschovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie

Hliníková tuba obsahujúca 50 g alebo 100 g gélu.

Dátum poslednej revízie

Apríl 2008

V 2107/5861