

Trigrip

Analgetikum, antipyretikum

Příbalová informace – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Trigrip

Tvrďá tabletky

Držitel rozhodnutí o registraci:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Výrobce:

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo ve spolupráci s WALMARK, a.s., Oldřichovice, Česká republika.

Složení:

Léčivé látky:

1 tvrdá tabletky obsahuje: Paracetamol 200 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Coffeinum 25 mg, Chlorphenamin hydrogennomaleas 2,5 mg.

Pomocné látky: želatina, glycerol-triesterát, monohydrát laktózy, chinolinová žluť, čištěná voda, sodná sůl erythrosinu, oxid titaničitý

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum

Charakteristika:

Trigrip zmírňuje bolesti a snižuje teplotu. Léčivá látka paracetamol se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a vede k poklesu zvýšené tělesné teploty a k útlumu bolesti hlavy, svalů, kloubů a bolesti v krku. Maximální koncentrace v krevním séru dosahuje již za 1-2 hodiny. Účinky paracetamolu jsou posilovány obsahem kofeinu. Kyselina askorbová (vitamin C) zvyšuje obranyschopnost organismu vůči infekci a tím podporuje účinky paracetamolu při léčbě příznaků chřipky a nemoci z nachlazení. Kofein má mírné povzbuzující účinky. Chlorfenamin snižuje otok sliznic nosu a dýchacích cest, zabráňuje zvýšené sekreci hlenu, a tím zmírňuje průběh onemocnění.

Indikace:

Přípravek je určen k léčbě příznaků chřipky a nemoci z nachlazení provázených horečkou. Je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Kontraindikace:

Kdy nesmíte přípravek Trigrip užívat?

Přípravek nesmí být užíván při:

- přecitlivělosti na léčivé látky nebo jiné složky přípravku
- geneticky podmíněném nedostatku glukoso-6-fosfátdihydrogenázy (nebezpečí chudokrevnosti způsobené zvýšeným rozpadem červených krvinek - hemolytická anémie)
- závažných poruchách funkcí jater a ledvin
- zvýšeném nitroočním tlaku (glaukomu s úzkým úhlem)
- zvětšení prostaty (adenom prostaty) provázeném zadržováním moči
- feochromocytomu (nádor dřene nadledvin)
- současně léčbě přípravky, které mohou poškodovat játra (některé přípravky používané k léčbě epilepsie, některá antibiotika)
- nadměrné nebo chronické konzumaci alkoholu
- poruchách srdečního rytmu
- vředech v zažívacím ústrojí
- těhotenství a kojení
- zánětu jater nebo žloutence

Přípravek není určen dětem do 15 let.

Ačkoli nebylo prokázáno, že by paracetamol mohl poškodit plod, Trigrip nesmí užívat kojící a těhotné ženy.

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek nemocní, u kterých se po podávání jiných přípravků proti bolesti objevil záchvat průduškového astmatu.

Nežádoucí účinky:

Jaké nežádoucí účinky by se při užívání přípravku mohly vyskytnout?

Při správném užívání se nežádoucí účinky objevují zřídka.

Delsí užívání přípravku ve vyšších dávkách může v ojedinělých případech způsobit poškození ledvin a jater; k závažnému poškození jater může dojít také při předávkování.

Ve velmi vzácných případech byly pozorovány poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček nebo bílých krvinek anebo všech krevních buněk) vyvolané paracetamolem.

V ojedinělých případech se objevují žaludeční a střevní potíže, únava, sucho v ústech, reakce z přecitlivělosti (např. kožní reakce) a potíže při močení. V ojedinělých případech může také dojít k vyvolání glaukomu (s úzkým úhlem).

Ojedinele byly popsány případy reakcí z přecitlivělosti na léčivou látku paracetamol (otoky obličej, dušnost, astmatický záchvat, pocení, nevolnost, pokles krevního tlaku až po šok).

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Interakce:

Může být přípravek Trigrip užíván současně s jinými léky?

Účinky některých léků se mohou při současném užití navzájem ovlivňovat, a to ve smyslu snížení nebo zvýšení jejich účinku nebo výskytu nežádoucích účinků. Pokud jste užívali, dlouhodobě užíváte nebo budete užívat nějaké léky (i volně prodejné), poraďte se před užitím přípravku Trigrip s lékařem.

Trigrip nesmí být užíván současně s léky, které působí tlumivě na centrální nervový systém nebo s alkoholem, a to vzhledem k vzájemnému zvyšování účinku.

Při současném užívání léků, které zvyšují odbourávání paracetamolu, jako jsou např. přípravky na spaní a přípravky působící proti epileptickým záchvatům (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a rifampicin (lék proti tuberkulóze), se zvyšuje toxické působení paracetamolu na játra.

Nežádoucí účinky chloramfenikolu mohou být při současném užívání přípravku Trigrip zvýšeny.

Dávkování a způsob použití:

Jak se tabletky užívají?

Pokud není předepsáno jinak, užívají dospělí na začátku léčby 2 tabletky 3krát denně (ráno, v poledne, večer). Tabletky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Po zmírnění příznaků se užívá dále 1 tabletky 3krát denně.

Upozornění:

Bez porady s lékařem nesmí být přípravek užíván déle než 7 dní. Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů a nebo se naopak zhorší, kontaktujte lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s užíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Při současném užívání s jinými přípravky obsahujícími paracetamol nesmí denní dávka u dospělých překročit 4 g.

Při užívání doporučených dávek může přípravek ovlivnit pozornost, a to i v takovém rozsahu, že schopnost aktivní účasti v silničním provozu nebo obsluhování strojů může být omezena.

V případě podezření na (úmyslné nebo náhodné) předávkování kontaktujte ihned lékaře, i když nemáte ještě žádné potíže!

Co byste měli dělat, pokud jste užili nižší dávku přípravku, než jste měli užít, a nebo jste dávku vynechali?

Pokud jste užili nižší dávku přípravku nebo jste dávku vynechali, nezvyšujte další dávku přípravku, ale pokračujte v užívání podle dávkovacího schématu.

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

20 tvrdých tobolek

Datum poslední revize textu

26.4.2006

W A L M A R K®

Dispatch note of print out packing material

W A L M A R K®

Design / Year: David Horák / 2003 DTP operator / Studio: David Horák / Internal Proof numb. / Date 1. proof: 6 / 06.9.2006

Used printing material: Non Wood Offset Paper 50g Special printing technology: NO Used Colours: 1 Cut Size (mm): 160x210 mm

B L A C K

Trigrip

Analgetikum, antipyretikum

Písomná informácia pre používateľa

Informácie na použitie, čítajte pozorne!

Trigrip

kapsuly

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118
Bad Vilbel, Nemecko

Zloženie:

1 kapsula obsahuje liečivá:

paracetamolom (paracetamol) 200 mg, acidum ascorbicum (kyselina askorbová) 150 mg, coffeinum (kofeín) 25 mg, chlorphenaminum hydrogenomaleas (chlórphenamíniumhydrogénmaleinát) 2,5 mg

Pomocné látky:

gelatina (želatína), glyceroli tristearas (glyceroltriestérát), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), titanii dioxidum (oxid titaničitý E 171), flavum quino-
lini (chinolínová žltá E 104), erythrosinum natrium (sodná soľ erythrozínu E 127)

Farmakoterapeutická skupina:

analgetikum, antipyretikum

Charakteristika:

Trigrip zmiernuje bolesť a znižuje horúčku. Liečivo paracetamol sa dobre vstrebáva z tráviaceho systému a vedie k poklesu zvýšenej telesnej teploty a útlmu bolesti hlavy, svalov, kĺbov a bolesti v hrdle už za ½-1 hodinu. Tieto účinky sú posilnené obsahom kofeínu. Kyselina askorbová (vitamín C) zvyšuje obranyschopnosť organizmu proti infekciám a tak podporuje účinky paracetamolu pri liečbe príznakov chrípky a pri prechladnutí. Kofeín má mierne povzbudzujúce účinky. Chlórphenamíniumhydrogénmaleinát zmiernuje opuch nosových slizníc pri infekciách dýchacích ciest, zabraňuje zvýšenej sekrécii hlienu, a tým zmiernuje priebeh ochorenia.

Indikácie:

Na liečbu príznakov chrípkových infekcií a pri prechladnutí.

Liek sa podáva dospelým a deťom starším ako 15 rokov.

Kontraindikácie:

Precitlivosť na paracetamol, chlórphenamíniumhydrogénmaleinát, kofeín, kyselinu askorbovú alebo inú zložku lieku.

Liek sa nesmie používať pri závažnej funkčnej poruche obličiek alebo pečene, vrodenom nedostatku glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (hemolytická anémia), zvýšenom vnútroočnom tlaku (glaukóm zatvoreného uhla), benígnej hypertrofii prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty), pacientom súbežne užívajúcich antidepresíva.

Liek sa nesmie podávať deťom do 15 rokov.

Vzhľadom na to, že liek obsahuje laktózu nie je vhodný pre pacientov, ktorí trpia na galaktosémiu (neschopnosť organizmu meniť galaktózu na glukózu), vrodenú laktózovú malabsorpciu (porucha vstrebávania laktózy) alebo glukózo-galaktózovú malabsorpciu (porucha vstrebávania glukózy a galaktózy).

Gravidita a laktácia

Kvôli bezpečnosti sa liek počas farchavosti a dojčenia nesmie podávať.

Nežiaduce účinky:

Liek sa pri odporúčanom dávkovaní dobre znáša.

Nežiaduce účinky vyvolané paracetamolom, ktorý sa podáva v liečebných dávkach, sa vyskytujú zriedka. Objaví sa môžu kožné vyrážky, alergia, ojedinele pocit na dávenie, dávenie, ospalosť, závraty, prechodné zníženie počtu trombocytov.

V prípade kofeínu po podaní vyšších dávok sa môže vyskytnúť búšenie srdca, nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť.

Chlórphenamíniumhydrogénmaleinát môže vyvolať kožné reakcie, poruchy normálnych pohybov, psychotické reakcie, prípadne zmeny krvného obrazu, útlm.

Pri dlhodobom podávaní vyšších dávok môže vzniknúť poškodenie pečene a obličiek, vzniká riziko glaukómu a poruchy močenia.

V prípade výskytu nežiaducich účinkov prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.

Interakcie:

Účinky lieku Trigrip a iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Trigrip sa nesmie súbežne užívať spolu s liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém, lebo môže dôjsť k zosilneniu sedatívnych (tlmiacich) účinkov.

Pri kombinácii s anticholinergikami (antihistaminiká, tricyklické antidepresíva, anticholinergne pôsobiacie antiparkinsoniká, parasympatolytiká, spazmolytiká) môže dôjsť k zosilneniu anticholinemých účinkov.

Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol.

Trigrip sa nesmie podávať s rifampicínom, glutetimidom, fenobarbitalom, fenytoínom, karbamazepínom.

Metoklopramid urýchľuje vstrebávanie a nástup účinku paracetamolu.

Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.

Bez konzultácie s lekárom ne užívajte súbežne iné lieky (vrátane voľnopredajných).

Dávkovanie a spôsob použitia:

Dospelí a deti staršie ako 15 rokov: na začiatku liečby sa podávajú 2 kapsuly a po ustúpení príznakov ochorenia 1 kapsula ráno, na obed a večer. Kapsuly je potrebné zapíť dostatočným množstvom tekutiny.

Ak príznaky ochorenia do 3 dní neustúpia, vyhľadajte lekára.

Zvláštne upozornenia:

V odporúčaných dávkach liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť rýchleho rozhodovania (vedenie motorového vozidla, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Tieto činnosti môžete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.

Liek obsahuje paracetamol.

Užívanie vyšších dávok ako sú odporúčané môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.

Liek ne užívajte dlhodobo; ak počas 3 dní liečby neustúpia príznaky ochorenia, liek ďalej ne užívajte a obráťte sa na lekára.

Počas liečby nesmieme piť alkohol a užívať sedatíva (lieky na upokojenie, zvlášť barbituráty), pretože môže dôjsť k zvýšeniu tlmivého účinku.

U športovcov sa po podaní lieku môže potvrdiť pozitívny výsledok antidopingovej skúšky.

V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď lekára.

Varovanie:

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uchovávanie:

Liek uchovávať pri teplote do 15 - 25 °C.

Liek uschovávať mimo dosahu detí!

Balenie:

20 kapsúl

Dátum poslednej revízie:

September 2006

Liek distribuuje v Slovenskej republike WALMARK, s r.o., Žilina.

Trigrip je registrovaná ochranná známka WALMARK, a.s.

W 1590/L/02W/CZE,SLO